5. 双曲空間の球面幾何

球面幾何は 簡単に触れました. 例えば「球面での直線は大円であること」や、「2本の直線は必ず2点で交わること」さらに「大円の極限が極限円で, 2本の極限円は交わらないこともある」(点Aを通り極限円BCと交わらない極限円は1本だけ引ける)ことを述べました. ここでは, 双曲空間内の球面三角比の公式について調べてみます.

球面上に3点A,B,Cを取った時,

$$\angle BAC = (\text{平面OABと平面OACのなす角}), \quad a = (\text{線分BCの長さ}) = \angle BOC$$

のように, 線分の長さは中心角, 2直線のなす角は2平面のなす角で測ります. (定義)

[spherical geometry.cg3](#)

上の定義は, ユークリッド空間と双曲空間で共通です. さらに, ユークリッド空間では, 次のような球面三角比の公式が成り立ちます. (G・ジェニングス著「幾何再入門」)

$$\left\{ \begin{array}{ll} \cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A & (\text{長さの余弦定理}) \\ \cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a & (\text{角度の余弦定理}) \dots (*) \\ \frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C} & (\text{正弦定理}) \end{array} \right.$$

ところが, 意外な事に, 双曲空間内の球に関しても, 全く同じ公式が成り立ちます. 1つの理由は「球面三角比の公式」は全て「角度に関する公式」であり, 双曲空間でも1回転は 360° だからです. 一方「(円周の長さ) $=2\pi r$ 」等の「(純粋な)長さに関する公式」は, 双曲空間とユークリッド空間で異なります.

例として球面直角三角形を考えます。まず「長さの余弦定理」より「球面三角形の三平方の定理」は次のようになります。(ユークリッド空間での初等的な証明は[こちら](#))

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A \xrightarrow{A=90^\circ} \cos a = \cos b \cos c \quad (\text{三平方の定理})$$

a, b, c が非常に小さい時は、近似的に 平面の三平方の定理と一致して「納得」です。

$$\cos a = \cos b \cos c \iff 1 - \frac{1}{2}a^2 \approx \left(1 - \frac{1}{2}b^2\right)\left(1 - \frac{1}{2}c^2\right) \iff a^2 \approx b^2 + c^2$$

pythagoras.cg3

例えば「 $b = \angle COA = 20^\circ$, $c = \angle AOB = 40^\circ$ 」のとき、ユークリッド空間の球面では、

$$a = \angle BOC = \cos^{-1}(\cos b \cdot \cos c) = 43.95 \dots \text{度} \approx 45^\circ$$

となりますが、これは、

$$\left[\text{弧AC} = \frac{1}{18} \times \text{円周}, \text{弧AB} = \frac{1}{9} \times \text{円周} \right] \text{のとき, } \left[\text{弧BC} \approx \frac{1}{8} \times \text{円周} \right]$$

を表しています。従って「球の全方位への対称性」を考えると、双曲空間内の球でも上の関係が成り立つ事は、「なんとなく」うなずけます。

(注) もちろん Bolyai や Lobachevsky は、このような直感的な議論ではなく、もっと厳密に証明しています。

(Bolyai の方は ちょっと簡潔すぎる気もしますが...) Bolyai の証明と、 H^3 モデルによる検証を [Topics のページ](#) に置いておきます。証明には、双曲三角比の公式 (第 8 章) を使います。